

Aanbrengen van één of meerdere implantaten in de boven- en/of onderkaak

Het tandvlees wordt losgemaakt waarna een gaatje in de kaak wordt geboord waarin het implantaat wordt gedraaid. Op het implantaat wordt een afdekschroefje geplaatst waarna het tandvlees wordt gehecht. Deze hechtingen lossen na 10-14 dagen vanzelf op.

Pijn

De plaatselijke verdoving is gewoonlijk na 2 uur uitgewerkt. Wij adviseren u gedurende die tijd geen heet of koud voedsel/dranken te gebruiken. De onderlip en tong aan de behandelde zijde zijn gedurende die tijd gevoelloos. Het gevoel komt daarna geleidelijk terug. Pijn kunt u bestrijden met paracetamol, maximaal 4 keer 1000 mgr. per 24 uur of met de voorgeschreven pijnstillers, meestal Ibuprofen 600 mgr, 3 keer per 24 uur in te nemen. Neem deze pijnstillers alleen als u ze nodig heeft.

Antibioticum

Laat altijd weten of u overgevoelig bent voor een bepaald antibioticum. Hier wordt dan met het voorschrijven rekening mee gehouden. Wanneer u een antibioticum voorgeschreven krijgt lees dan altijd de bijsluiters aandachtig door en maak de kuur volledig af. Bij overgevoeligheidsverschijnselen zoals jeuk, huiduitslag of ademnood belt u direct met de kliniek, tel. 079-3438530. Na 17.00 uur tel. 071-5269111.

Zwelling

Als gevolg van de operatieve behandeling kan uw wang aanzienlijk gaan zwellen. Om de zwelling te beperken adviseren wij u de wang aan de behandelde zijde te koelen met een cold-pack of ijsblokjes in een plastic zak in een washandje. U koelt gedurende 20 minuten waarna u dit na 10 minuten herhaalt. U kunt dit zo vaak doen als u wilt. Het is niet aan te raden om na de behandeling in de zon te gaan zitten. Dit kan aanleiding geven tot meer zwelling, pijn en mogelijk en verhoogde kans op infectie.

Nabloeding

De wond is na de behandeling gehecht waardoor de kans op nabloeding gering is. In ieder geval bijt u gedurende een half uur na de ingreep op een gaastampon tenzij anders is aangegeven. Het is van groot belang dat u de eerste 12 uur na de behandeling de mond niet spoelt omdat dit de kans op nabloeding vergroot. Voorzichtig tanden poetsen, met ontzien van de plaats waar de operatie heeft plaatsgevonden, is geen probleem. Mocht er om wat voor reden dan ook toch een nabloeding optreden is het van groot belang de mond eerst goed te reinigen van stolsels, donker gekleurde bloedproppen, en daarna gedurende een half uur dicht te bijten op een gaastampon of schone zakdoek. Dit zonedig enkele malen herhalen.

Temperatuurverhoging

Gedurende de eerste dagen na de behandeling is een verhoging van de lichaamstemperatuur mogelijk.

Wanneer deze hoger wordt dan 39 graden neem dan contact op met de kliniek, tel. 079- 3438530. Na 17.00 uur tel. 071-5269111.

Wondhygiëne

Voor een goede wondgenezing is het van belang dat de mond goed schoon gehouden wordt. Dit kunt u bereiken door de mond 3 tot 4 keer per dag te spoelen met zout water of met de voorgeschreven mondspoeling.

Controle

Controle vindt plaats na een week waarbij er een controle röntgenfoto gemaakt gaat worden.

Algemene adviezen

- ✓ Spoelt u de mond de eerste dag niet om nabloeding te voorkomen. Voorzichtig tanden poetsen is geen probleem. Daarna kunt u de mond spoelen met zout water.
- ✓ Wij adviseren u de eerste dagen niet te roken en matig alcohol te gebruiken vanwege de wondgenezing.
- ✓ Wij adviseren u de eerste dagen na de behandeling het hoofd tijdens het slapen hoger te houden, dit voorkomt extra zwelling.
- ✓ Wij adviseren u de eerste dagen na de behandeling niet te sporten. Dit vergroot de kans op nabezwaren zoals bloeding en zwelling.
- ✓ In geval van problemen neemt u contact op met de kliniek, tel. 079-3438530. Na 17.00 uur en in het weekend tel. 071-5269111.